

HEBUCOL Artichaut 200 mg dragées

HEBUCOL®
Artichaut

Dénomination:

HEBUCOL® Artichaut
Extrait aqueux sec de feuilles d'artichaut

(WILL-PHARMA)

Classification ATC5

Classe	Description
A05AX	TRACTUS GASTRO-INTESTINAL ET METABOLISME
	CHOLAGOGUES ET HEPATOPROTECTEURS
	THERAPIE VESICULAIRE ET CHOLAGOGUE
	AUTRES MEDICAMENTS POUR LA THERAPIE VESICULAIRE

Fabricant :

LABORATORIA WOLFS
Westpoort 50-58
2070 Zwijndrecht.

Composition qualitative et quantitative :

Cynara scolymus fol. succ. extr. aquos. siccum 200 mg - Diatom. purific. -
Amylum solani - Talcum - Dimethiconum - Calcii hydrogenophosphas - Silica
colloïdalis anhydrica - Castor. Hydrogenat. Oleum - Magnesii stearas.
Enrobage :

Polyvidonum - Titanii dioxidum - Opadry white - Opaglos white 6000.
q.s.p. 1 dragée.

Forme pharmaceutique:

Dragées

Indications thérapeutiques

Cette préparation à base de plante est utilisée comme cholagogue, après que toute pathologie sévère ait été écartée. Parallèlement, elle provoque également une légère augmentation de l'élimination rénale d'eau.

Posologie et mode d'administration :

Posologie :

La dose usuelle est de 2 dragées 3 fois par jour. La dose maximale est de 12 dragées par jour réparties en 3 prises.

La durée d'un traitement moyen est d'environ 20 jours.

Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.

Mode d'administration :

Prendre les dragées au moment des repas avec de l'eau.

Contre-indications :

- Atteintes néoplasiques du foie et des voies biliaires
- Insuffisance hépatique grave.
- Angiocholite aiguë.
- Calculose du canal cholédoque.
- Hypersensibilité à un des constituants de la préparation.

Précautions particulières d'emploi

La prudence est requise en cas de lésions hépatotoxiques.
Eviter des aliments mal tolérés par les patients atteints d'affections hépatobiliaires.

Utilisation en cas de grossesse et de lactation :

En l'absence d'information suffisante sur la prise d' Hebucol® Artichaut pendant la grossesse et la lactation, le produit est déconseillé.

Effets indésirables :

L'HEBUCOL® Artichaut peut parfois exercer une action laxative.

Symptômes de surdosage, traitement d'urgence et antidotes:

En cas de surdosage éventuel, un traitement symptomatique s'impose.

Propriétés pharmacologiques :

L'extrait sec de *Cynara scolymus* est utilisé pour son effet cholagogue et favorise l'élimination rénale de l'eau.

Durée de stabilité :

Une date de péremption figure sur l'emballage après l'abréviation EX (mois/année), signifiant périmé le 1er jour du mois indiqué.

Précautions particulières de conservation :

Conserver dans l'emballage d'origine, à température ambiante (15-25°C), à

l'abri de la lumière et de l'humidité. Tenir hors de portée des enfants.

Nature et contenu des différents conditionnements :
Tube de 60 dragées.

Nom du titulaire d'enregistrement :

WILL-PHARMA

Siège social : avenue Monplaisir 33, 1030 Bruxelles

Correspondance : rue du Manil 80, 1301 Wavre

Dernière mise à jour de la notice :

02/2006.

Mode de délivrance :

Libre.