

HEBUCOL Artisjok 200 mg dragees

HEBUCOL®
Artisjok

Benaming:

HEBUCOL® Artisjok
Droog waterig extract van artisjokbladeren

(WILL-PHARMA)

ATC5 Rangschikking

Klasse	Omschrijving
A05AX	MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING
	GAL- EN LEVERTHERAPEUTICA
	GALTHERAPEUTICA
	OVERIGE GALTHERAPEUTICA

Fabricant :

LABORATORIA WOLFS
Westpoort 50-58
2070 Zwijndrecht.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling :

Cynara scolymus fol. succ. extr. aquos. siccum 200 mg - Diatom. purific. -
Amylum solani - Talcum - Dimethiconum - Calcii hydrogenophosphas - Silica
colloïdalis anhydrica - Castor. Hydrogenat. Oleum - Magnesii stearas.
Omhuiling :

Polyvidonum - Titanii dioxidum - Opadry white - Opaglos white 6000.
q.s.p. 1 dragee.

Farmaceutische formulering:

Dragees

Therapeutische indicaties

Deze bereiding op basis van planten wordt gebruikt als cholagogum, nadat ernstige pathologieën werden uitgesloten. Het veroorzaakt ook een lichte toename van de uitscheiding van water door de nieren.

Posologie en wijze van toediening:

Posologie:

De gebruikelijke dosis bedraagt 2 dragees 3 maal per dag. De maximale dosis bedraagt 12 dragees per dag, verdeeld over 3 innamen.

De duur van een gemiddelde behandeling bedraagt ongeveer 20 dagen.

Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.

Toedieningswijze:

De dragees bij de maaltijden met water nemen.

Contra-indicaties :

- Neoplastische aandoeningen van de lever en van de galwegen
- Ernstige leverinsufficiëntie.
- Acute angiocholitis.
- Stenen in de ductus choledocus.
- Overgevoeligheid voor bestanddelen van het preparaat.

Bijzondere gebruiksvoorzorgen

Voorzichtigheid is vereist in geval van hepatotoxische letsels.
Vermijden van voedingsmiddelen die door patiënten met hepatobiliaire aandoeningen slecht worden verdragen.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding:

Bij gebrek aan voldoende informatie over het gebruik van Hebucol® Artisjok tijdens de zwangerschap en de borstvoeding, wordt het product ontraden.

Bijwerkingen :

HEBUCOL® Artisjok kan soms een laxatieve werking hebben.

Symptomen van overdosering, urgente behandeling en antidotum:

In geval van een eventuele overdosering, moet een symptomatische behandeling worden ingesteld.

Farmacologische eigenschappen :

Het droge extract van *Cynara scolymus* wordt gebruikt voor het cholagogisch effect en voor het stimuleren van de eliminatie van water door de nieren.

Stabiliteit:

Een vervalddag is op de verpakking aangegeven met de afkorting EX (maand/jaar). De vervalddag is de eerste dag van de aangegeven maand.

Bijzondere voorzorgen bij de bewaring:

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, bij omgevingstemperatuur (15-25° C), beschut tegen licht en vocht. Buiten het bereik van kinderen houden.

Aard en inhoud van de verschillende verpakkingen :
Buisje met 60 dragees.

Naam van de houder van de registratie :

WILL-PHARMA

Sociale zetel : avenue Monplaisir 33, 1030 Brussel

Correspondentie : rue du Manil 80, 1301 Wavre

Laatste bijwerking van de bijsluiter :

02/2006

Aflevering :

Vrije verkoop.